

Rubus hispidus (Ostružiník štětinatý)

synonyma: R. var. cupulifer, R. var. major, R. var. obovalis, Rubus obovalis, Rubus obovatus, Rubus sempervirens, Selnorition obovalis

čeleď: Rosaceae

oblasti: Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA v podobě stálezeleného výběžkatě plazivého keře. Dorůstá do výšky 50cm, ale větve jsou dlouhé až 1,5m a hustě štětinaté. Palisty jsou úzce šídlovité a dlouhé 5 - 8mm. Listy jsou 3 (i 5)tičetné, zpravidla štětinaté, vlastní lístky jsou hrodité, tuhé, tmavězelené, lesklé, hrubě 2x pilovité, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek, centrální lístek je kosočtvercovitě obvejčitý, špičatý, dlouhý 3 - 6cm, řapíček dlouhý 0,5 - 1cm, postranní listy jsou zkosené, vejčité, řapíčky dlouhé 1 - 2mm, listy na fertilních větvích 3četné, horní jednoduché, obvejčité a zpravidla zakulacené. Květenství je chocholičnaté, chudé, vrcholové, občas i 1 - 2četné, stopky ochlupené nebo i štětinaté, vlastní květy mají kališní lístky eliptické s hrotem, dlouhé 4mm, korunní lístky obvejčité, bílé a dlouhé 8mm. Plodenství je tmavěčervené nebo růžovofialové, později až černé, dlouhé 1,2cm a tvoří je 10 - 20 peckoviček.

<https://www.rostliny.net/>