

Rubus adspersus

synonyma: Rubus adspersus, Rubus carpinifolius, Rubus carpinifolius f. glandulosus, Rubus carpinifolius var. pseudohemistemon, Rubus fruticosus subsp. carpinifolius, Rubus fruticosus var. carpinifolius, Rubus lentiginosus, Rubus luteifolius, Rubus pilosus var. carpinifolius, Rubus pyramidalis f. subglandulosus, Rubus villicaulis var. carpinifolius, Rubus vulgaris f. carpinifolius

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA. Kmínky jsou 2leté nebo vytrvalé, plazivé, dlouhé 1 - 2m a mají malé zahnuté štětinaté ostny. Palisty jsou šídlovité, dlouhé 1cm. Listy jsou 5tičetné, řapíky s řapíčky zahnutě ostnité, řapíky dlouhé 4 - 6cm, vlastní lístky jsou eliptické až mírně obvejčité, 2x pilovité, oboustranně zašpičatělé nebo tupé, dlouhé 2 - 6cm, centrální lístek má 0,5 - 2cm řapíček, postranní jsou prakticky přisedlé, na fertilních větvích (vzpřímené mají délku 10 - 30cm a jsou ostnité) v dolní části 5tičetné, nahoře 3četné, centrální lístky je eliptický až široce vejčitý, dlouhý 4 - 6cm, řapíček dlouhý 1 - 2cm, postranní lístky jsou vejčité až obvejčité, krátce řapíčkaté. Vlastní květy vyrůstají po 1 - 4ks na koncích větví, mají 5 - 7cm stopku, kališní lístky jsou vejčitěkopinaté, dlouhé 8mm, korunní lístky jsou eliptické, bílé a dlouhé 1cm. Plodenství je mírně protáhlé, dlouhé 1 - 2cm, široké 1 - 1,2cm a tvoří jej mnoho peckoviček.

<https://www.rostliny.net/>