

Rubus trivialis

synonyma: Rubus carpinifolius, Rubus continentalis, Rubus hispidus, Rubus hispidus subsp. continentalis, Rubus mississippianus, Rubus okeechobeus, Rubus rubrisetus, Rubus sanguinolentus, Rubus tallahasseeanus, R. var. serosus

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA v podobě stálezeleného keře. Kmínky jsou 2leté, rozkladité nebo plazivé, ochlupené, dlouhé 0,5 - 2m a mají malé mírně zploštělé ostny. Palisty jsou čárkovitě šídlovité a opadavé. Listy jsou 3 - 5tičetné, vlastní lístky jsou prakticky kožovité, vejčité nebo obkopinaté, pilovité, zubaté, tmavězelené, lesklé, dlouhé 2 - 6cm, spodní strana je světlejší, centrální lístek má 0,3 - 1,5cm řapíček, postranní jsou krátce řapíčkaté až prakticky přisedlé, na fertilních větvích jsou listy 3čtné, lístky eliptické, zakulacené nebo tupé a dlouhé 1 - 4cm. Květe zpravidla samostatnými květy na 2 - 5cm stopce, kališní lístky jsou eliptické, hrotité až zašpičatělé, dlouhé 5 - 6mm, korunní lístky jsou bílé, obvejčité a dlouhé 1 - 1,5cm. Plodenství bývá podlouhlé, černé a velikosti 1 - 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>