

Colchicum bivonae (Ocún skvrnity)

synonyma: *Colchicum amabile*, *Colchicum amabile* var. *variopictum*, *Colchicum autumnale* var. *bivonae*, *Colchicum autumnale* var. *variopictum*, *Colchicum bowlesianum*, *Colchicum busambarensis*, *Colchicum latifolium*, *Colchicum neapolitanum* var. *variopictum*, *Colchicum pulchrum*, *Colchicum sibthorpii*, *Colchicum tuntasium*, *Colchicum variegatum*, *Colchicum variopictum*

čeleď: Colchicaceae

oblasti: Itálie, Korsika, Řecko, Sicílie

Druhové jméno bylo vybráno na počest sicilského botanika A. Bivona-Bernardiho (1774 - 1837). Roste na Sicílii, Korsice a v Řecku jako trvalka. Pod zemí vytváří podlouhlou na vrcholu zúženou hlízu s tmavě hnědými slupkami. Listy vytvářejí přízemní 5 - 9tičetnou růžici, jsou kopinaté, dlouhé do 25cm a vyrůstají po odkvětu. Květy jsou bělavé s hustou růžovofialovou jemnou síťovitou kresbou a 6ti cípy délky 5 - 6,5cm. Plodem je 3boká tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Apollo'

Vyhovují mu světlé lesy, pastviny, louky atp.

<https://www.rostliny.net/>