

Aster laevis (Hvězdnice hladká)

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Dorůstá výšky 0,5 - 1,3m. Povrch je modře ojíňený, ale lodyha je obvykle holá. Horní lodyžní listy jsou 2 - 4x delší než široké. Kvete v úboru o průměru 0,8 - 1,5cm, zákrovní listy vytvářejí jasně ohraničené kosočtvercovité plochy, vyplňují jen horní 1/2 listenu, spodní část tvoří čárkovitý pruh, okvětní lístky jsou modré až fialové nebo bílé. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *concinus* - lodyžní listy čárkovité

<https://www.rostliny.net/>