

Aster novi-belgii (Hvězdnice novobelgická)

synonyma: Amellus novae-belgii

čeleď: Asteraceae

oblasti: Connecticut, Česká republika, Delaware, Irsko, Katalánsko, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Švýcarsko, Vermont

Pochází z USA a Kanady. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 0,6 (i 1,4)m. Listy jsou tmavězelené a lesklé, korní lodyžní jsou čárkovité až dlouze kopinaté, celokrajné nebo zubaté, obvykle 4 - 10x delší než široké. Kvete v úboru o průměru 1 - 1,5cm, zákrovní listeny jsou prakticky stejně dlouhé (vnější o 1/2 kratší než vnitřní), široké 0,7 - 1mm, vnější listeny v horní části zelené prakticky bez bělavého okraje a okvětní lístky jsou modré (i bílé). Hodí se k řezu. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Audrey' - výška 30cm; květenství kompaktní, plnokvěté, okvětní lístky modrorůžovofialové
- 'Carnival'
- 'Court Herald' - květenství 1/2plné, okvětní lístky červené
- 'Crimsons Brocade' - okvětní lístky růžově červené
- 'Ernest Ballard' - výška 1m; okvětní lístky růžově fialově červené
- 'Karmin Kuppel' - výška 1m; růžovofialové poloplné květy
- 'Marie Ballard' - světle fialové květy
- 'Mulberry' - květenství 1/2plné, okvětní lístky červené
- 'Royal Ruby'

Vyhovuje jí plné slunce a pravidelná zálivka s nevápenitou půdou.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

<https://www.rostliny.net/>