

Aesculus x neglecta (Jírovec přehlížený)

synonyma: *Aesculus x glaucescens*, *A. f. erythroclados*, *A. var. erythroclados*

čeleď: Hippocastanaceae

oblasti: Alabama, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Kříženec *A. flava* a *A. sylvatica*. Roste v USA v podobě stromu (i keře). Dorůstá výšky 8 - 10 (i 18)m. Větve jsou v mládí šedé. Listy jsou 5tičetné, vlastní lístky jsou obvejčité, mohou být 1 - 2x pilovité, v mládí růžové, později světlezelené až žlutozelené, dlouhé 10 - 16cm a řapíčky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenstvím je lata délky 10 - 15cm, vlastní květy jsou bleděžluté s červeným žilkováním, kalich úzce zvonkovitý, ochlupený, korunní lístky jsou nestejně a na bázi načervenalé žilkované. Plody jsou kulovité, hladké, široké 2 - 4cm a obsahují 1 semeno. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Autumn Fire' - strom; listy při rašení měďnaté, později tmavězelené, na podzim oranžovožluté; květy béžovožluté

- 'Erythroblastos'/'Erythroblasta' - listy v mládí červenorůžové až červené, později zelené, na podzim oranžové nebo žlutočervené, lístky úzce obvejčité, 1 - 2x pilovité, dlouhé 10 - 15cm; květy červenožluté, kalich je jemně ochlupený

<https://www.rostliny.net/>