

Cirsium eriophorum (Pcháč bělohavý)

synonyma: *Carduus eriophorus*, *Carduus spurius*, *Carthamus ferox*, *Cirsium chatenieri*, *Cirsium chodatii*, *Cirsium corbariense* var. *costae*, *Cirsium dinaricum*, *Cirsium eriocephalum*, *C. subsp. britannicum*, *C. subsp. chatenieri*, *C. subsp. chodatii*, *C. subsp. degenii*, *C. subsp. dinaricum*, *C. subsp. velenovskyi*, *C. subsp. vulgare*, *C. var. costae*, *Cirsium insubricum*, *Cirsium oviforme*, *Cirsium proponticum*, *Cirsium vandasii*, *Cirsium velenowskyi*, *Cnicus cinaroides*, *Cnicus eriophorus*, *Cnicus spinosissimus*, *Epitrachys propontica*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alpy, Česká republika, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko

Dorůstá výšky (0,5 -) 0,6 - 1,5m. Kvete růžovofialovými květy v úboru, zákrovy jsou kulovité, širší 5cm a pavučinovitě ochlupené. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *eriophorum* (Pcháč bělohavý pravý)
- subsp. *odontolepis*
- subsp. *richterianum*
- subsp. *spathulatum*

Vyhovuje mu plné slunce, stráně, okraje lesů, pastviny, atp.

<https://www.rostliny.net/>