

Cirsium vulgare (Pcháč obecný)

synonyma: *Ascalea lanceata*, *Ascalea lanceolata*, *Carduus firmus*, *Carduus lanceolatus*, *Carduus vulgaris*, *Chamaepeuce firma*, *Cirsium abyssinicum*, *Cirsium auriculatum*, *Cirsium balearicum*, *Cirsium britannicum*, *Cirsium dubium*, *Cirsium firmum*, *Cirsium fraternum*, *Cirsium lanceolatum*, *Cirsium lanceolatum* subsp. *sylvaticum*, *Cirsium lanceolatum* var. *abyssinicum*, *Cirsium lanceolatum* var. *album*, *Cirsium lanceolatum* var. *hypoleucum*, *Cirsium lanceolatum* var. *nemorale*, *Cirsium lanceolatum* var. *riphaeum*, *Cirsium lanceolatum* var. *vulgare*, *Cirsium lanigerum*, *Cirsium leucanicum*, *Cirsium linkii*, *Cirsium longespinosum*, *Cirsium microcephalum*, *Cirsium mielichhoferi*, *Cirsium misilmerense*, *Cirsium spurium*, *Cirsium strigosum*, *C. f. erdneri*, *C. subsp. crinitum*, *C. subsp. silvaticum*, *C. var. nemorale*, *Cnicus firmus*, *Cnicus lanceolatus*, *Cnicus lanceolatus* var. *abyssinicus*, *Cnicus strigosus*, *Cynara lanceata*, *Eriolepis lanceolata*, *Lophiolepis dubia*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Alpy, Altaj, Andalusie, Argentina, Arizona, Arkansas, Austrálie, Brazílie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Čile, Delaware, Florida, Georgia, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, J Afrika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Makaronésie, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, S Afrika, S Nový Zéland, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Čína, Z Sibiř, Západní Virginie

Pochází z Evropy, ale rozšířil se do velké části zeměkoule. Patří mezi dvouletky nebo krátkověké rostliny. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5 (i 2)m. Pod zemí vytváří silný vřetenovitý kořen. Lodyha je přímá, na konci větvená, hustě olistěná a ostnitě křídlatá. Listy jsou střídavé, sbíhavé, hluboce a velice ostře peřenosečně vykrajované. Spodní strana je šedě plstnatá. Vytvářejí přízemní růžici. Kvete červenofialovými květy v úboru o průměru (2 -) 2,5 - 4 (i 5)cm, délky (1,5 -) 1,8 - 3cm seskupenými do hroznů na koncích větví, zákrov je vejčitý, užší 4cm a max. mírně pavučinovitý a má trny délky 4 - 8mm. Plodem je nažka délky 3,5 - 4,8mm s chmýrem s délkou 2 - 2,5cm (jediná rostlina jich má až několik tisíc). Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *crinitum*
- subsp. *silvaticum*
- subsp. *vulgare* (Pcháč obecný pravý)

Vyhovují mu chudší suché až mírně vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny, rumišťe, atp. na světle.

<https://www.rostliny.net/>