

Trifolium resupinatum (Jetel zvrácený)

synonyma: Amoria resupinata, Galearia resupinata, T. subsp. suaveolens, Xerosphaera resupinata

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Louisiana, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Německo, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 55)cm. Stonek má poléhavý nebo vystoupatavý, obvykle dutý a široký 4mm. Při styku s půdou znovu nekoření. Listy jsou 3četné, vlastní lístky obvejčitého tvaru se špičkou a pilovým okrajem, délou 2,5cm a šířkou 1,5cm. Kvete bílofialovými, růžovými nebo fialovými 4 - 9mm květy na dlouhé stopce, vydávají medovou vůni, kalich je stočený zpět, má 12 žilek a koruna je dlouhá 4 - 6mm. Plodem je lusk obsahující 1 - 2 semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. majus
- var. microcephalum

Vyhovují mu kypré i jílovité půdy bohaté na živiny a teplo. Vyskytuje se u okrajích cest nebo rumištích.

<https://www.rostliny.net/>