

Borago officinalis (Brutnák lékařský)

čeleď: Boraginaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Illinois, Irsko, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Maine, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Střední střeozemí, SZ Afrika, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Malé Asie a střeozemí (zavlečen byl i jinde) jako trvalka, ale obvykle se pěstuje jako jednoletka. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 70 (i 80)cm a šířky do 45cm. Pod zemí vytváří silný a hluboký kořen. Stonek je dužnatý, s pupeny a okraji listů stříbřitě chlupatý. Listy jsou na kraji zvlněné a celokrajné, bazální vejčité až kopinaté, dlouhé až 15cm, široké 10cm, řapík je dlouhý 15cm, lodyžní listy jsou eliptické až podlouhlé, dlouhé 5 - 15 (i 20)cm, široké 6 (i 10)cm, žilnatina na spodní straně je vystouplá a řapík je dlouhý 16cm. Květenstvím je řídký vijan, vlastní květy jsou kolovité, 5tičetné, dlouze stopkaté, modré, hvězdíkovité, kalich má délku 1,3 (i 1,5)cm, šířku 3 (i 4,5)mm, kališní lístky jsou u báze srostlé, koruna je kolovitá průměru (2 -) 2,5 - 3cm, cípy jsou vejčité a špičaté. Plodem je asymetrická obvejčitá žebnatá bradavčitá tvrdka délky 5,5 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - bílé květy
- 'Variegata' - žluté skvrny na listech

Vyhovuje mu plné slunce a vlhká propustná půda, v lepším případě vápenitou s dostatkem živin. Květy jsou jedlé, obsahují velké množství nektaru a jsou tedy lákavé i pro velké množství hmyzu. Sklízají se mladé výhony a květy, ze kterých se dělá čaj. Přidává se do salátů, pomazánek, atp. Chuť listů připomíná okurky.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>