

Cotoneaster acutifolius (Skalník ostrolistý)

synonyma: *C. f. glabriusculus*, *C. var. pekinensis*, *Cotoneaster niger* var. *acutifolius*, *Cotoneaster sinensis*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Henan, Idaho, Indiana, Manitoba, Mongolsko, Montana, Ontario, Quebec, S Čína, Saskatchewan, Washington, Wyoming, Z Čína

Roste v Číně v podobě opadavého keře až nízkého stromu. Dorůstá výšky 2 - 4m. Větve jsou obloukovité, v mládí hnědé až černohnědé a ochlupené. Listy mají řapíky délky 0,2 - 1cm, čepel je eliptická až vejčitě kopinatá, báze široce klínovitá, konec špičatý, v mládí oboustranně ochlupená, olysávající, zelená, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek, celková délka je 1,5 - 5cm a šířka 1 - 4,2cm. Kvete v 2 - 4cm 2 - 5tičetném chocholíku. Češule mají pohárkovitý hustě ochlupený tvar. Vlastní květ má v průměru 7 - 8mm, kališní lístky jsou dlouhé 1 - 2mm, široké 1,5 - 2mm, konec mají špičatý až hrotitý. Okvětní lístky jsou bílé nebo načervenalé při bázi, tvar mají široce obvejčitý nebo podlouhlý, délku 3,5 - 4,5mm a šířku 3 - 4mm. Plody mají černou barvu. Plody jsou černé, eliptické až kulovité o průměru 0,4 - 1cm a obsahují 2 - 3 pecky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acutifolius*/*C. otto-schwarzii* - Čína, Mongolsko; výška 1,5 - 2; vzpřímené ohnuté větve; růžové korunní lístky
- var. *glabricalyx* - Henan; čepel délky 2,5 - 3,5cm, oboustranně ochlupená (spodní hustší); plody neznámé
- 'Nana' - výška do 1,2,
- 'Rothschildianus' - bleděžluté plody
- var. *villosus* - západní Čína; výška 2 - 5m; listy délky 5 - 6,5 (i 11)cm, šířka 2,9 - 3,6 (i 5)cm

<https://www.rostliny.net/>