

Cotoneaster affinis

synonyma: *C. var. typicus*, *Cotoneaster bacillaris var. affinis*, *Cotoneaster frigidus var. affinis*, *Cotoneaster virgatus*, *Mespilus affinis*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Bhútán, Čína, Himálaj, Kašmír, Nepál, Sikkim

Roste v Číně, Bhútánu, Kašmíru, Nepálu a Indii v podobě opadavého keře až nízkého stromu. Dokáže dorůst do výšky až 6m. Větve jsou vzpřímené a rozkladité, mají červenohnědou až zelenohnědou barvu a v mládí jsou hřebíkatě ochlupené. Listy mají 0,4 - 1cm řapíky, čárkovité až kopinaté palisty, čepel vejčitou až obvejčitou, široce klínovitou bází, konec tupý nebo špičatý, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek, spodní strana je hustě žlutě plstnatá, celková délka je 2,5 - 10cm a šířka 1,4 - 5cm. Květenství má velikost 3 - 4cm. Květy mají stopky délky 1 - 4mm, v průměru mají 1 - 1,2cm, poupata jsou bílá nebo narůžovělá, kališní lístky jsou 3úhlé a špičaté, okvětní lístky bílé zakulacené až vejčité, dlouhé 3 - 4mm. Plody mají v průměru 6 - 8 (i 1,4)cm, vejčitý nebo obvejčitý tvar, barvu hnědou až černou a obsahují 2 pecky. Existuje vnitrodruhový taxony:

- var. *bacillaris*/*C. bacillaris* - Himálaj; výška 7 - 8m

<https://www.rostliny.net/>