

Cotoneaster atropurpureus

synonyma: Cotoneaster horizontalis var. prostratus

čeleď: Rosaceae

oblasti: Hubei

Roste v Číně v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1m (s oporou 3 - 4m). Větve jsou poléhavé až vystoupavé, obloukovité, v mládí červené, nažloutle ochlupené. Listy jsou papírovité, na sterilních výhonech obvejčité až kulaté, na konci uťaté nebo tupé, krátce hroťité, báze je tupá až špičatá, okraj mírně zvlněný, horní strana lesklá tmavězelená, holá, spodní řídce žlutě ochlupená, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek, řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm, celková délka je 0,9 - 1,4cm a šířka 0,8 - 1,2cm. Květenství je 1 - 3četné, stopky květů mají délku 1mm. Květy s češulí měří 6mm. češule j nálevkovitá. Kališní lístky jsou špičaté, zelené až červené, okraj žlutě ochlupený, okvětní lístky jsou tmavěčervené s načernalou bází. Plody jsou červenooranžové, řídce ochlupené, obvejčité a velké 7 - 8mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegatus' - výška 60 - 90cm, šířka 1,8 - 2,4m; listy mají zvlněné bílé okraje, na podzim narůžovělé; plody jsou červené

<https://www.rostliny.net/>