

# Cotoneaster cooperi

čeleď: Rosaceae

oblasti: Bhútán, Indie, Xizang (Tibet)

Rostle v Bhútánu, Tibetu a Indii v podobě opadavého řídkého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2,5 - 6m. Větve jsou v mládí plstnaté, olysávají, mají hnědočervenou barvu a jsou drobně bradavičnaté. Listy jsou papírovité, na sterilních větvích kopinaté až eliptické, na konci špičaté, báze klínovitá, horní strana zelená, matná, řídce na centrálním žebře ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek, spodní strana je šedě- (i bíle-) huňatá, řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm, celková délka je 2,4 - 9cm a šířka 0,7 - 3,9cm. Květenství je 8 - 30tičetné, široké kolem 3cm. Květy mají 1 - 5mm stopky, češule je zvonkovitá, kališní lístky tupé až zahrocené, olysávají, poupata jsou bílá (občas s růžovými tečkami), koruna je dlouhá 5 - 7mm, okvětní lístky jsou rozložené. Plody jsou obvejčité nebo kulovité, červené až červenofialovočerné, dlouhé 0,6 - 1cm a široké 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *microcarpus* - Bhútán; tenké dlouze převislé větve; kulatější 7mm růžovofialovočervené květy
- 'Nicolette' - efektní květenství; jasně červené plody
- 'Rumsey Gardens' - menší husté keře s méně početnými červenými plody
- 'Taranto' - tmavězelené lesklé listy; hnědočervené plody

<https://www.rostliny.net/>