

## Cotoneaster frigidus (Skalník chladnomilný)

synonyma: *Cotoneaster affinis*, *Cotoneaster comptus*, *Cotoneaster frigidus*, *Cotoneaster himalaiensis*, *Cotoneaster himalayensis*, *Cotoneaster nepalensis*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Bhútán, Irsko, Nepál, Sikkim, Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu, Nepálu, Bhútánu a Indii v podobě opadavého až poloopadavého keře nebo nižšího stromu s mnoha kmínky a deštníkovitou korunou. Dorůstá výšky 2 - 10 (i 15 - 18)m. Větve jsou široce převislé, v mládí ochlupené a hnědé. Listy jsou eliptické až vejčité kopinaté nebo obvejčité, konec špičatý nebo tupý, báze klínovitá, horní strana je holá, tmavězelená, na spodní straně šedě plstnaté, olýsávají, řapík je dlouhý 0,4 - 1,2cm, celková délka je 3,5 - 17,7cm a šířka 1,5 - 5,6cm. Květenstvím je 20 - 40 (i 200)četný chocholík délky 4 - 6cm a šířka 3 - 5cm. Květy mají průměr 6 - 7mm, 2 - 4mm plstnaté stopky, okvětní lístky bílé, rozložené, široce vejčité až kulaté, velké 3 - 4mm. Plody jsou červené, kulovité nebo eliptické, v průměru mají 4 - 7mm a obsahují 2 pečičky. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Notcutt's Var.' - vzpřímený habitus; větší svěže zelené listy; červené plody

- 'Pendulus' - převislé větve

- 'Xanthocarpus' - žluté až bílé plody ve velkých soukvětích

<https://www.rostliny.net/>