

Cotoneaster henryanus (Skalník Henryho)

synonyma: *Cotoneaster frigidus*, *Cotoneaster pritzelii*, *Cotoneaster rugosus* var. *henryanus*, *Cotoneaster salicifolius* var. *henryanus*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Střední Čína

Roste v Číně v podobě poloopadavého nebo i stálezeleného rozkladitého keře nebo stromku. Dorůstá výšky do 5 - 7m. Větve jsou obloukovité, odstávající, ochlupené, zelenohnědé až červenofialovočerné. Listy jsou eliptické až úzce obvejčité, téměř kožovité, špičaté s klínovitou bází, horní strana je mírně svrasklá, spodní v mládí šedě plstnatá, později jen na žilnatině, žilnatinu tvoří 7 - 12 párů zapaštěných žilek, řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm, celková délka je 4,5 - 12cm a šířka 2 - 4,4cm. Květenství je 10 - 40tičetné, široké 3 - 5cm, ochlupené. Květy mají ochlupené stopky, špičaté kališní lístky, korunu délky 6 - 7mm, okvětní lístky jsou holé. Plody jsou vejčité, obvejčité nebo kulovité, barvy tmavé hnědočervené nebo červené, průměru 5 - 7mm a obsahuje 2 - 3 pecky. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Anne Cornwallis' - výška do 2,5m; polostálezelené listy vejčitého nebo kopinatého tvaru s mírně zvlněným okrajem, délkou 6 - 10cm a šířkou 2,5cm, horní strana je holá, spodní sivozeleně ochlupená; žluté mírně naoranžovělé nebo červené plody obvejčitého tvaru velikosti 7 - 8mm

- 'Corina' - vystoupavé vysoké i široké keře; listy kožovité, na spodní straně plstnaté; bleděčervené až červenooranžové bohaté plodenství

<https://www.rostliny.net/>