

# Cotoneaster hissaricus

synonyma: *Cotoneaster racemiflorus*, *Cotoneaster racemiflorus* var. *hissaricus*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Afganistán, Írán, Tádžikistán

Roste v Tádžikistánu a Afganistánu v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2m. Větve jsou vzpřímené, obloukovité, hnědé, hustě porostlé lenticelami a drobnými bradavkami, v mládí jsou ochlupené. Listy jsou papírovité až téměř kožovité, na sterilních větvích zakulacené nebo široce obvejčité, konec je kulatý nebo uťatý, báze kulatá nebo klínovitá, horní strana mírně vrásčitá, tmavězelené, mírně lesklá, olysává, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů mírně zapuštěných žilek, spodní strana bývá v mládí hustě ochlupená, řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm, celková délka je 2,3 - 3cm a šířka 2,1 - 2,4cm. Květenství je 4 - 13tičetné. Květy mají 2 - 6mm stopky, pohárkovitou češuli, kališní lístky špičaté, okraj široký blanitý a bělavý, konec nafialovělý, poupata jsou bílá a narůžovělá, koruna má velikost 7 - 9mm, okvětní lístky jsou rozložené. Plody jsou růžovofialovočerné až černé, řídce ochlupené, velké 7 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>