

# Cotoneaster hupehensis

synonyma: *Cotoneaster kangtinensis*, *Cotoneaster racemiflorus* var. *veitchii*, *Cotoneaster silvestrii*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Jiangxi, New York, Sichuan

Roste v Číně v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 4)m. Větve jsou obloukovité, skloněné nízko nad zemí, mají červenohnědou až šedohnědou barvu, v mládí jsou ochlupené. Listy jsou papírovité, eliptické až vejčité, zašpičatělé, báze zakulacená nebo široce klínovitá, horní strana je holá, mírně ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, spodní je tenče šedě plstnatá, řapíky mají délku 3 - 5mm, celková délka je 1,5 - 4cm a šířka 1 - 2,3cm. Květenstvím je (3 -) 6 - 12tičetný chocholík. Květy mají v průměru 0,9 - 1,2cm, stopky délky 1 - 6mm, češule je pohárkovitá, kališní lístky špičaté nebo tupé, okvětní lístky bílé, zakulacené s průměrem 4 - 5mm. Plody jsou červené, kulovité nebo mírně zploštělé, široké 0,7 - 1,4cm.

<https://www.rostliny.net/>