

Cotoneaster marginatus

synonyma: *Cotoneaster buxifolius* var. *marginatus*, *Cotoneaster lanatus*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Indie, Nepál

Roste v Indii a Nepálu v podobě polostálezeleného nebo stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 5m. Větve jsou vzpřímené, vystoupavé, široce rozkladité, červenofialovorůžové, v mládí nažloutle ochlupené. Listy jsou kožovité, na sterilních větvích vyrůstají ve spirále nebo 2řadě, mají eliptický, obvejčitý nebo mírně kopinatý tvar, konec tupý nebo špičatý (vzácně vykrojený), báze je klínovitá nebo tupá, okraj huňatý, horní strana někdy mírně vrásčitá, tmavězelená, mírně lesklá, v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 6 mírně zapuštěných párů žilek, spodní strana je bledězelená a síťnatá, v mládí ochlupená, řapíky jsou dlouhé 1 - 6mm. Květenství je 2 - 10tičetné. Květy mají 3 - 7mm stopky, češuli široce zvonkovitou, kališní lístky špičaté, někdy hrotité, okraj může být červený, poupata jsou bílá, narůžovělá, koruna má délku 0,8 - 1,2cm, okvětní lístky jsou rozložené, bílé. Plody jsou kulovité, zploštělé, červené až tmavěčervené, řídce huňaté, velikosti 0,8 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>