

Cotoneaster multiflorus (Skalník mnohokvětý)

čeleď: Rosaceae

oblasti: Gansu, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Írán, Kavkaz, Kazachstán, Liaoning, Ohio, Qinghai, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Sierra Nevada (Španělsko), Ťan-šan, Vnitřní Mongolsko, Xinjiang, Xizang (Tibet), Yunnan, Z Asie, Z Sibiř

Roste v Číně, Rusku, střední a západní Asii v podobě opadavého široce rozkladitého keře až stromu. Dorůstá výšky (1 -) 2 - 3,5 (i 6)m. Větve jsou slabé, obloukovitě převislé (i nízko nad zemí), červenohnědé a v mládí plstnaté. Listy jsou vejčité až kulaté či eliptické, na konci zašpičatělé nebo tupé, zelené, dlouhé (1,5 -) 2 - 5cm, široké (1,2 -) 1,5 - 3 (i 4)cm, báze je široce klínovitá nebo zaoblená, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek, spodní strana je šedozelená, na středním žeburu obvykle načervenalá, v mládí ochlupená a načervenalý řapík má délku 0,3 - 1cm. Květenstvím je 5 - 20 (i 21)tičetný chocholík, vlastní květy mají 3 - 6mm stopku, průměr 1 - 1,2cm, kališní lístky tupé nebo špičaté, holé, korunní lístky jsou bílé, kulaté, dlouhé 4 - 5mm a vydávají nepříjemný zápach. Plodem jsou červené nebo fialovorůžovočervené, téměř kulovité až obvejčité malvice délky (0,5 -) 0,7 - 0,8 (i 1,2)cm a obsahují obvykle 2 pecky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *atropurpureus*/*C. chungtiensis* - Sichuan, Xizang, Yunnan; výška 2 - 3m; větve nestejně široce rozkladité, hnědé, lesklé, s lenticelami, v mládí ochlupené; listy okrouhlé až široce obvejčité nebo široce eliptické, délka 2,6 - 2,8cm, šířka 2 - 2,5cm, žilnatina z 5 - 7 párů, spodní strana huňatá, horní zelená, řapíky délky 4 - 8mm; květenství 9 - 16tičetné, květy 1 - 4mm stopky, koruna délka 1 - 1,2cm, korunní lístky bílé; plody zploštěle kulovité, červené a žluté, délky (5 -) 7 - 8mm a průměru 0,8 - 1cm

- var. *calocarpus*/*C. calocarpus*/*C. przewalskii* - západní Čína; výška 2 - 3m; větve vzpřímené, obloukovité, hnědé, s lenticelami, v mládí ochlupené; listy užší, délky 3 - 6cm, tvaru vejčitékopinatého až široce vejčitého, báze tupá nebo klínovitá, konec špičatý, horní strana červenohnědá později tmavězelená, holá, matná, žilnatina ze 6 - 8 párů žilek, spodní v mládí hustě huňatá, řapíky délky 5 - 7mm; bohatší 5 - 25tičetné květenství, okvětní lístky mají při bázi růžovou skvrnku, koruna má délku 1,2 - 1,5cm; plody červené až hnědé, vejčité kulovité, velikosti 1 - 1,2cm

- var. *granatensis*/*C. granatensis* - španělská Sierra Nevada; výška až 6m; obloukovité větve; spodní strana listů v mládí ochlupená, délka 2 - 5cm, tvar eliptický nebo okrouhlý, báze široce klínovitá; květenstvím je podlouhlý bohatý chocholík; plody hruškovité, červené, velikost 6 - 9mm, obsahuje 2 pecky

- var. *multiflorus*/*C. magnificus*/*C. reflexus* - červené plody průměru 7 - 8mm

<div>Vyhovují mu hlinitopísčité až jílovité půdy s mírně zásaditým pH na plném slunci. Dobře snáší sucho.</div>

<https://www.rostliny.net/>