

Cotoneaster obscurus (Skalník tmavý)

čeleď: Rosaceae

oblasti: Sichuan, Z Čína

Roste v Číně v podobě opadavého rozkladitého keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve obloukovitě odstávají, jsou hnědé nebo růžovofialovohnědé, v mládí žlutě ochlupené. Listy jsou téměř kožovité, eliptické, vejčité kopinaté až kosočtvercovitě vejčité, báze tupá nebo klínovitá, horní strana puchýřnatá, tmavězelená, mírně lesklá nebo matná, v mládí ochlupená, na spodní straně šedožlutě plstnatá, žilnatinu tvoří 3 - 7 párů žilek, řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm, celková délka je 2 - 4,5cm a šířka 1,2 - 2,8cm. Květenství je 3 - 12tičetné v chlupaté okoličnaté latě. Květy jsou bílé, narůžovělé, zvonkovité, češule je pohárkovitá, kališní lístky špičaté nebo tupé, červené nebo nahnědlé, protáhlé, dlouhé 6 - 9mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *cornifolius*/C. *cornifolius* - Sichuan; mnohokmenný; výška 4 - 5m; větve úzce vzpřímené, hnědé, v mládí ochlupené; opadavé téměř kožovité listy, na sterilních větvích eliptické nebo obvejčité, špičaté, báze tupá nebo klínovitá, horní strana puchýřnatá, zelená, matná, v mládí řídkce ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 10 párů žilek, spodní strana je bledězelená, řídkce ochlupená, řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm, celková délka je 4 - 8cm, šířka 2,4 - 4,1; květenství je 5 - 30tičetné, květy mají 2 - 8mm stopky, včetně češule délku 5 - 7mm, pohárkovitá češule, kališní lístky špičaté nebo tupé, okvětní červené se špinavě bílým okrajem; plody obvejčité, červené až hnědé, velikosti 0,8 - 1cm

<https://www.rostliny.net/>