

Cotoneaster pannosus (Skalník suknovitý)

čeleď: Rosaceae

oblasti: Havajské ostrovy, Kalifornie, Katalánsko, Oregon, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě poloopadavého keře. Dorůstá výšky 2 - 3,5 (i 5)m. Větve jsou obloukovité, rozložené i nízko nad zemí, v mládí růžovofialovočerné. Listy bývají 2řadé, kožovité, eliptické až vejčité nebo úzce eliptické, konec je špičatý nebo tupý, báze široce klínovitá, matně zelené, nakonec mírně svrasklé, spodní strana je bíle nebo šedě plstnatá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenství je 6 - 20tičetné, polokulovité. Květy mají 1 - 5mm plstnaté stopky, nálevkovitou češuli, 5 kališních plstnatých lístků, 5 téměř okrouhlých okvětních lístků o délce 3 - 4mm. Plody jsou kulovité nebo vejčité, bleděčervené, velké 6 - 8mm a obsahují 2 pecky. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Nanus' - zakrslý
- var. *pannosus* - Sichuan, Yunnan; listy eliptické nebo vejčité, široké, délky 2 - 3cm
- var. *robustior* - Yunnan; listy úzce eliptické, dlouhé 3 - 4cm

<https://www.rostliny.net/>