

Cotoneaster racemiflorus (Skalník hroznatý)

synonyma: *Cotoneaster fontanesii*, *Cotoneaster fontanesii* var. *desfontainii*, *Cotoneaster nummularius*, *Cotoneaster nummularius* var. *racemiflorus*, *C. var. desfontainesii*, *C. var. typicus*, *Mespilus racemiflora*, *Mespilus racimiflora*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Írán, Kavkaz, Quebec, S Afrika, Středozeří, SV Čína, Turkestán, Z Asie, Z Čína, Z Himálaj

Roste ve středozeří a jihozápadní Asii v podobě opadavého široce rozkladitého opadavého keře. Dorůstá výšky 2,5 (i 4)m. Větve jsou obloukovité, nízko skloněné, olysávají, červenohnědé, v mládí šedě plstnaté. Listy jsou široce eliptické, obvejčité nebo zaokrouhlené, na konci tupé a hrofité nebo špičaté, občas vykrojená, báze je tupá nebo klínovitá, horní strana olivově zelená, matná, v mládí řídce ochlupená, spodní strana bíle nebo šedě plstnatá, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, řapíky jsou plstnaté, dlouhé 1,5 - 2,5cm, celková délka je 1 - 4cm. Květenství je 3 - 12 (i 16)tičetné. Květy mají narůžovělá poupata, průměr 0,8 - 1cm, stopky plstnaté, češuli pohárkovitou, kalich plstnatý, kališní lístky špičaté, okvětní lístky bílé. Plodem je červená kulovitá malvička velikosti 7 - 9mm obsahující 2 pecky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *desfontainii* - eliptické přišpičaté listy
- var. *microcarpa*/C. *microcarpus*/C. *soongoricus* var. *microcarpus* - západní Čína; výška 1,5 - 2m; větve vzpřímené obloukovité, převíslé, hnědé, lesklé, s lenticelami, v mládí krátce ochlupené; listy papírovité nebo téměř kožovité, vejčité, eliptické až zaokrouhlené, báze tupá nebo špičatá, báze klínovitá nebo tupá, horní strana zelená, matná, olysává, žilnatinu tvoří 5 - 7 mírně zapuštěných žilek, spodní je hustě huňatá, řapíky mají délku 4 - 7mm; květenství 5 - 18tičetné; květy mají tenké stopky, češule je pohárkovitá, kališní lístky špičaté, konec červený, poupata bílá, koruna velikosti 6 - 7mm, okvětní lístky rozložené, bílé; plody kulovité až eliptické, červené, lesklé, velké 5 - 8mm
- var. *nummularius* - Kavkaz, přední Asie po západní Himálaj; výška 0,5 - 1,5m; kratší větve; drobnější listy s horní řidčeji ochlupenou stranou, délkou 1 - 2,5cm; drobnější 2 - 7mičetné květenství; plody velikosti 7 - 8mm
- var. *royleanus*/var. *kotschyi*/var. *orbiculari*/C. *nevadensis*/C. *royleanus* - Himálaj; výška 1m; okrouhlé až široce obvejčité listy se zaobleným až vykrojeným koncem, délka 0,8 - 2cm; květy ve 2 - 6tičetném svazku
- var. *soongoricus*/var. *songarica*/var. *songoricus*/C. *soongoricus* var. *soongoricus* - severovýchodní Čína; výška do 2m; větve dlouze převisají; listy 2řadé, tuhé, vejčité, tupé, šedozelené, v mládí ochlupené, dlouhé 2,5 - 3,5cm; květenství 3 - 12tičetné, řidké; plody červené, dlouhé 0,7 - 1cm
- var. *veitchii*/C. *hupehensis*/C. *veitchii* - Čína; výška 2 - 5m; větve vzpřímené, obloukovité, rozkladité, červenohnědé, v mládí plstnaté; listy opadavé, kožovité, eliptické, vejčité nebo zaokrouhlené, špičaté, báze tupá, horní strana zelená až tmavě hnědozelená, lesklá, olysává, žilnatina ze 4 - 5 párů žilek, spodní strana šedozelená, hustě huňatá, řapíky délky 4 - 6mm; květenství je 3 - 15tičetné; květy mají 3 - 8mm stopky, zvonkovitou huňatě plstnatou češuli, kališní lístky špičaté nebo hrofité, plstnaté, okraj načervenalý, bílá poupata s růžovým nádechem, koruna velikosti 1,2 - 1,5cm, okvětní lístky rozložené, bílé; plody kulovité, červené až hnědočervené, velké 1 - 1,3cm