

Cotoneaster rehderi

synonyma: *Cotoneaster bullatus* var. *macrophyllus*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Větve jsou vzpřímené, obloukovité, hnědé, s lenticelami, v mládí ochlupené. Listy jsou téměř kožovité, na sterilních větvích eliptické nebo obvejčité, špičaté, báze tupá, klínovitá, uťatá nebo ouškatá, horní strana puchýřnatá, zelená, lesklá, v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 8 - 11 párů žilek, spodní strana je bledězelená, v mládí žlutě ochlupená, řapíky jsou dlouhé do 3mm, celková délka je 7 - 21cm a šířka 4,5 - 9cm. Květenství je 10 - 30tičetné, květy mají 2 - 4mm stopky, včetně češule délku 5 - 6mm, češule je mělce pohárkovitá, lesklá, kališní lístky špičaté, lesklé, holé, okvětní lístky červené až hnědé s růžovým okrajem. Plody jsou kulovité nebo zploštělé, červené, lesklé, velké 0,8 - 1,1cm.

<https://www.rostliny.net/>