

Cotoneaster rubens

synonyma: Cotoneaster notabilis

čeleď: Rosaceae

oblasti: Bhútán, Myanmar (Barma), Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Myanmaru a Bhútánu v podobě opadavého nebo polostálezeleného vzpřímeného rozprostřeného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Větve jsou vzpřímené, šedočerné, v mládí ochlupené. Listy jsou papírovité nebo téměř kožovité, zaokrouhlené nebo široce eliptické, na konci tupé nebo hrodité (vzácně špičaté), báze je zaoblená nebo tupá, horní strana holá, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, spodní hustě žlutě plstnatá, řapík je dlouhý 1 - 2mm, celková délka je 0,8 - 2,8cm a šířka 0,6 - 2,1cm. Květenství je 1 - 3četné. Květy mají v průměru 8 - 9mm, češule je zvonkovitá, červenohnědá, kališní lístky 3úhlé, špičaté nebo tupé, okvětní lístky vzpřímené, tmavěčervené, zaokrouhlené nebo široce obvejčité, dlouhé 4 - 5mm. Plody jsou červené, holé, lesklé, kulovité až obvejčité, velké 0,8 - 1,1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. minimus - listy délky 0,8 - 1cm, šířka 6 - 8mm, na konci tupé nebo mírně hrodité; plody obvykle se 3mi peckami
- var. rubens - listy délka 1 - 2,3cm a šířka 0,8 - 1,8cm, konec tupý nebo hroditý (někdy špičatý); plody obvykle se 2 - 3mi peckami

<https://www.rostliny.net/>