

Cotoneaster sherriffii

synonyma: *Cotoneaster ludlowii*, *Cotoneaster muliensis*, *Cotoneaster schlechtendalii*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Bhútán, Sichuan, Xizang (Tibet)

Roste v Číně a v Bhútánu v podobě hustého polostálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2,5m. Větve jsou hnědé, s lenticelami, v mládí řídce ochlupené. Listy vyrůstají ve spirále, jsou téměř kožovité, eliptické až zaokrouhlené, vzácně obkopinaté, na konci tupé a hrotilé, báze klínovitá nebo zakulacená, horní strana tmavězelená až zelená, řídce ochlupená, spodní žlutošedě přitiskle huňatá, řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm, celková délka je 0,6 - 2cm, šířka 0,4 - 1,2cm. Květenstvím je 2 - 11tičetný vrcholík velikosti 1 - 2,5cm. Květy mají 3 - 7mm stopky, češuli pohárkovitou nebo nálevkovitou, kališní lístky špičaté nebo zahrocené, poupata růžová, květy narůžovělé nebo bílé, v průměru mají 0,9 - 1cm, korunní jsou lístky bílé, téměř zaokrouhlené, v průměru mají 3 - 4mm. Plody jsou kulovité nebo eliptické, červené až oranžovočervené, v průměru mají 0,5 - 1,1cm.

<https://www.rostliny.net/>