

Cotoneaster taylorii

synonyma: *Cotoneaster nitidus* subsp. *taylorii*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou úzce vzpřímené, obloukovité, v mládí hustě žlutě ochlupené, červenohnědé, drobně bradavčité. Listy jsou okrouhlé nebo široce vejčité, na konci tupé nebo špičaté báze zaoblená nebo klínovitá, horní strana lesklá, tmavězelená nebo zelená, v mládí oboustranně krátce štětinatá, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek, řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm, celková délka je 1 - 3,8cm a šířka 0,9 - 2,4cm. Květenství je 1 - 4četné. Květy mají 0,3 - 1cm stopky, zvonkovitou češuli, kališní lístky 3úhlé a tupé nebo špičaté, koruna je kulovitá, okvětní lístky vzpřímené, tmavěčervené s bílým okrajem, téměř zaokrouhlené, velké 3 - 4mm. Plody jsou červené, obvejčité, obsahují 2 - 4 pecky.

<https://www.rostliny.net/>