

Cotoneaster verruculosus

synonyma: *Cotoneaster distichus* var. *verruculosus*, *Cotoneaster improvisus*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Bhútán, JZ Čína, Nepál, Sikkim

Roste v Číně, Bhútánu, Nepálu a Indii v podobě opadavého nebo polostálezeleného vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 2m. Větve jsou vzpřímené nebo vystoupavé, bradavičnaté, hnědé, v mládí řídce ochlupené. Listy jsou téměř okrouhlé nebo široce vejčité, konec je tupý, špičatý nebo vykrojený a hrotitý, báze široce klínovitá nebo zaoblená, oboustranně přitiskle ochlupená, spodní strana je téměř holá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry mírně zapuštěných žilek, celková délka je 0,6 - 1,4cm a šířka 0,5 - 1,4cm. Kvete obvykle samostatnými květy, v průměru mají 7 - 8mm, jsou téměř přisedlé, češule je zvonkovitá, lesklá, olysává, kališní lístky jsou vejčité 3úhlé, tupé nebo špičaté, olysávají, mají délku 1,5 - 2,5mm, okvětní lístky vzpřímené, růžové nebo červené, téměř zaokrouhlené, dlouhé 4 - 5mm. Plody jsou červené, kulovité až široce obvejčité, lesklé, holé, v průměru mají 0,7 - 1cm a obsahují obvykle 2 pecky.

<https://www.rostliny.net/>