

## Berberis sikkimensis

synonyma: *Berberis chitria* var. *sikkimensis*, *B.* var. *baileyi*, *B.* var. *glabramea*

čeleď: Berberidaceae

oblasti: Bhútán, Nepál, Sikkim, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu, Nepálu a Indii v podobě 1/2stálezeleného až opadavého keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2,5m. Větve jsou tmavěšedé, v mládí světle žluté, trny bohaté, 3klané a dlouhé 0,5 - 2cm. Listy jsou krátce řapíkaté, obvejčité, špičaté nebo zakulacené s hrotem, mohou mít 1 - 5 párů trnitých zubů, tmavězelené, lesklé, kožovité, dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 0,5 - 2cm, báze klínovitá a žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek. Květenstvím je 3 - 20tkvětá lata nebo hrozen, vlastní květy jsou žluté, vně načervenalé, široké 1 - 1,2cm, mají 4 - 8mm stopku, kališní lístky jsou ve 2 kruzích, vnější vejčité, dlouhé 3,5 - 4mm, široké 2,5 - 3mm, vnitřní eliptické, dlouhé 7 - 8mm, široké 5mm, korunní lístky jsou obvejčité, dlouhé 6mm a široké 4mm. Plodem je úzce vejčitá tmavěčervená bobule délky 1,5cm a šířky 4,5mm.

<https://www.rostliny.net/>