

Berberis vulgaris (Dřišťál obecný)

synonyma: *Berberis abortiva*, *Berberis acida*, *Berberis aethnensis*, *Berberis alba*, *Berberis angulizans*, *Berberis apyrena*, *Berberis arborescens*, *Berberis articulata*, *Berberis asperma*, *Berberis aurea*, *Berberis bigelovii*, *Berberis corallina*, *Berberis dentata*, *Berberis dentata* var. *capitata*, *Berberis dulcis*, *Berberis dumetorum*, *Berberis edulis*, *Berberis elongata*, *Berberis globularis*, *Berberis hakodate*, *Berberis heterophylla*, *Berberis iberica*, *Berberis innominata*, *Berberis irritabilis*, *Berberis jacquini*, *Berberis latifolia*, *Berberis marginata*, *Berberis maxima*, *Berberis maximowiczii*, *Berberis microphylla*, *Berberis mitis*, *Berberis nepalensis*, *Berberis nitens*, *Berberis obovata*, *Berberis orientalis*, *Berberis pangharengensis*, *Berberis pauciflora*, *Berberis racemosa*, *Berberis rubra*, *Berberis sanguinea*, *Berberis sanguinolenta*, *Berberis sibirica*, *Berberis sieboldii*, *Berberis sulcata*, *Berberis sylvestris*, *Berberis violacea*, B. f. *vulgaris*, B. subsp. *cantabrica*, B. subsp. *orientalis*, B. var. *acutifolia*, B. var. *alba*, B. var. *alpestris*, B. var. *apyrena*, B. var. *asperma*, B. var. *flava*, B. var. *iberica*, B. var. *ilicifolia*, B. var. *innominata*, B. var. *lutea*, B. var. *nigra*, B. var. *orientalis*, B. var. *purpurea*, B. var. *purpurifolia*, B. var. *rubra*, B. var. *sanguinea*, B. var. *serotina*, B. var. *sulcata*, B. var. *violacea*

čeleď: Berberidaceae

oblasti: Albánie, Alpy, Apeniny, Arménie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Černé moře, Česká republika, Delaware, Francie, Gruzie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, J Itálie, Jižní Dakota, JZ Rusko, Kansas, Karpaty, Katalánsko, Kavkaz, Kolorado, Korsika, Kosovo, Krym, Labrador, Maďarsko, Maine, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Pyreneje, Quebec, Rakousko, Rhode Island, Rumunsko, S Itálie, S Řecko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, SV Řecko, SZ Řecko, Švýcarsko, Ukrajina, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v Evropě, Severní Americe a Asii v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,8 - 2,5 (i 3)m s kmínky o tloušťce i 5 - 7cm. Větve jsou bohatě větvené, hnědožluté, brázdité, obloukovité a ostnitě (trny dlouhé 1 - 2cm); ostnitě jsou zejména na bázi vyrůstající výmladky, v mládí světle okrové až šedožluté, rýhované, s (1 -) 3 - 7midílnými trny z přetvořených listů. Lýko je sytě žluté. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou střídavé, vejčité až eliptické či kopist'ovité, asymetricky jemně pilovité (8 - 30 párů), krátce řapíkaté, dlouhé 2 - 6 (i 8)cm, široké (0,6 -) 1 - 2,5 (i 3,5)cm a u báze mají 3 trny. Květenstvím je převislý až 30tikvětý hrozen délky 4 - 7cm, vlastní květy jsou žluté, mají 0,5 - 1,2cm stopku, koruna je dlouhá 5 - 7mm a korunní lístky jsou vejčité. Plodem je 1cm dlouhá červená lesklá kyselá válcovitá bobule délky 0,8 - 1,5cm obsahující zploštělá bleděhnědá kapkovitá semena. Vydává nepříjemný zápach. S výjimkou dozrálých plodů jsou všechny části mírně jedovaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acutifolia* - listy špičaté
- subsp. *aethnensis* - Korsika, Sardínie, Sicílie a jižní Itálie; výška 30 - 60cm; větve v mládí načervenalé, trny dlouhé 1,2 - 2,5cm; listy ostnitě pilovité, dlouhé 1,5 - 4,5cm; hrozny dlouhé 2 - 3cm, 3 - 15tikvěté; plody černočervené
- 'Alba' - plody bílé nebo žlutobílé
- 'Atropurpurea'/f. *atropurpurea* - listy tmavě červené, spodní strana mírně ojíňená
- 'Aureomarginata'/f. *aureo-marginata* - listy na okraji žluté
- subsp. *australis*
- f. *brachybotryoides* - květenství husté, krátké
- var. *brachybotrys* - květenství zakrnělé
- 'Dulcis'/f. *dulcis*/var. *edulis* - plody sladké, max. mírně kyselé

- 'Euclea'/'Asperma'/f. enuclea/var. enuclea/B. thunbergii var. enuclea - plody bez semen
- var. emarginata - listy špičaté a kožovité
- var. litoralis - listy tenké
- f. longispinosa - trny bohaté, dlouhé
- 'Lutea'/f. lutea - listy tmavězelené; plody bleděžluté
- 'Marginata'/f. marginata - listy s bílými okraji
- f. oocarpa - plody větší
- 'Royal Cloak' - výška 1,8m; obloukovité větve; listy kulaté, tmavě červenorůžovofialové s šedými a bílými okraji
- subsp. seroi
- var. sulcata - větve v mládí hluboce rýhované
- subsp. vulgaris - výška 1,5 - 3m; větve v mládí nažloutlé, trny dlouhé 0,6 - 1,8cm; listy ostnitě pilovité, dlouhé 2,6 - 6cm; květenstvím je (12 -) 15 - 30tikvětý hrozen délky 3 - 5cm; plodem je červenooranžová bobule

Vyhovuje mu suchá kamenitá nebo písčité země s vápencovým podkladem, křoviny a teplejší místa. Dobře snáší sucho.

Množí se semeny nebo řízký.

<https://www.rostliny.net/>