

Gaultheria procumbens (Libavka polehlá)

synonyma: *Brossaea procumbens*, *Gaultheria humilis*, *G. f. accrescens*, *G. f. elongata*, *G. f. leucocarpa*, *G. f. suborbiculata*, *G. f. vitoidea*, *Gaultheria repens*, *Gautiera procumbens*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v podobě stálezeleného plazivého půdokryvného polštářovitého keře. Dorůstá výšky do 10 - 20 (i 30)cm. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, eliptické, mírně obvejčité nebo vejčité, vroubkovaně pilovité, lesklé, kožovité, tmavězelené, na podzim červenají, krátce řapíkaté, dlouhé (1 -) 2 - 3 (i 5)cm a široké 1 - 2cm. Kvete zpravidla samostatnými převislými květy (i v chudých malých hroznech) na 4 - 8mm stopce, kalich je bílý, široký 3 - 4mm, laloky vejčité, zašpičatělé, koruna je bílá až narůžovělá, široce baňkovitá až vejčitá, dlouhá 6 - 9mm, laloky jsou vejčité, tupé a zahnuté. Plodem je jedlá aromatická červená až růžová či bílá kulovitá tobolka průměru (0,6 -) 0,7 - 1,5cm, která vydrží na rostlině po celou zimu.

Potřebuje vlhčí kyselou písčitou půdu a polostín.

<https://www.rostliny.net/>