

Rheum rhabarbarum (Reveň kadeřavá)

synonyma: Rhabarbarum verum, Rheum franzenbachii, Rheum franzenbachii var. mongolicum, Rheum undulatum, Rheum undulatum, Rheum undulatum var. longifolium

čeleď: Polygonaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Illinois, Indiana, Kansas, Kolorado, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mongolsko, Německo, New Hampshire, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, S Asie, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Roste v Mongolsku a střední Asii jako samosprašná trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 0,9 (i 2)m. Kořeny dokáží dosáhnout hloubky až 2m. Listy jsou přízemní, zkadeřené, dlouhé 30 - 40cm, mají zelené nebo načervenalé řapíky, které se využívají v kuchyni jako náplň do buchet nebo na koláče. Kvete žlutými květy v mohutné latě. Plodem je 3křídlá a 3boká nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Cyclop'
- 'Dawes Challenge'
- 'Holštýnská krev'
- 'Jara' - červené řapíky
- 'The Sutton' - zelené řapíky
- 'Viktoria'

Vyhovuje ji vlhká hlinitá až těžká vápenitá půda bohatá na živiny. Při sklizni se listy vylamují a rostlině jich ponecháme zhruba 2/3ks.

Množí se dělením trsů nebo semen.

<https://www.rostliny.net/>