

Asplenium scolopendrium (Jelení jazyk obecný)

synonyma: Phyllitis scolopendrium

čeleď: Aspleniaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arménie, Česká republika, Čína, Gruzie, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kavkaz, Maďarsko, Makaronésie, Malá Asie (Anatolie), Maryland, Michigan, Německo, New Jersey, New York, Ontario, Palestina, Polsko, Řecko, Slovensko, Střední Asie, Středozeří, Švýcarsko, Zakavkazsko

Roste v chladnějším částech Evropy, středozeří, Azorských ostrovech, Kanárských ostrovech, Severní Americe, střední Asii a Číně jako trvalka. Pod zemí vytváří krátký vzpřímený plazivý oddenek. Listy neshazuje ani na zimu, rostou v trsech, dorůstají délky 15 - 50 (i 60)cm, po celé délce mají stejnou šířku, jsou celokrajné, lesklé, tmavězelené, špičaté, zvlněné, na spodní straně vytváří čárkovité výtrusnice a řapíky jsou dlouhé max. do 1/3 délky čepele. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *americanum*
- '*Angustifolia*' - výška 50cm, dlouhý úzký list
- '*Cristata*' - výška 40cm, hřebenovitý list
- '*Cristatum*' - zkadeřené konce listů
- '*Furcatum*' - výška 40,cm hřebenovitý list
- '*Undulata*' - výška 50cm, tmavězelený list

Vyhovují mu vlhká místa, vápencové skály nebo les s vysokou vlhkostí, stín nebo polostín, lehká bazická půda bohatá na živiny.

Množí se výtrusy/spórami.

<https://www.rostliny.net/>