

# Parthenocissus tricuspidata (Loubinec trojlaločný)

synonyma: *Acer nikoense*, *Ampelopsis haponica*, *Ampelopsis lowii*, *Ampelopsis minima*, *Ampelopsis tricuspidata*, *Ampelopsis tricuspidata* f. *veitchii*, *Ampelopsis veitchii*, *Ampelopsis veitchii* unr. *robusta*, *Ampelopsis veitchii* var. *purpurea*, *Cissus thunbergii*, *Cissus tricuspidata*, *Cissus veitchii*, *Crula nikoense*, *Crula nikoensis*, *Negundo nikoense*, *Parthenocissus thunbergii*, P. f. *lowii*, P. f. *purpurea*, P. f. *veitchii*, *Parthenocissus veitchii*, *Psedera thunbergii*, *Psedera tricuspidata*, *Vitis inconstans*, *Vitis taquetii*, *Vitis tricuspidata*

čeleď: Vitaceae

oblasti: Albánie, Belgie, Bulharsko, Burundi, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, J Nový Zéland, Japonsko, Jižní Karolína, Jugoslávie, JV Čína, Kentucky, Korea, Maine, Makaronésie, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Přímořský kraj, Rumunsko, S Nový Zéland, Severní Karolína, Tchaj-wan, V Čína, Vietnam

Roste v Japonsku, Číně, Koreji a Dálného východě v podobě popínavé dřevité liány. Dorůstá délky až 20m. Větve jsou kulaté, téměř holé, úponky krátké, bohatě větvené. Listy jsou střechovité, obrysem kulaté až vejčité, 3laločné, oboustranně lesklé, zelené, na podzim červené, dlouhé 5 - 6cm, široké 10 - 20cm, báze srdčitá, spodní strana na žilkách ochlupená, žilnatinu tvoří 5 žilek, řapíky dlouhé 4 - 12cm a laloky jsou špičaté hrubě pilovité. Kvete ve vrcholících kratších listů na stopce délky 1 - 3,5cm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají 2 - 3mm stopku a korunní lístky eliptické. Plodem je modře černá ojíňená bobule šířky (0,6 -) 0,8 - 1,2cm obsahující 1 - 2 (i 3) obvejčitá či hruškovitá semena délky 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Atropurpurea' - listy bývají jednoduché, velké, na horní straně modře zelené, narůžověle fialové, na podzim červené, mezi žilkami nafouklé; rychlý růst a často se zvrhává do původního druhu
- 'Aurata' - listy, žlutozelené, mírně zeleně mramorované a na okraji červené a drsné
- 'Beverly Brook' - listy velké do 10cm, v mládí bronzové, na podzim tmavě červené
- 'Beverly Park Form' - listy malé
- 'Fenway Park' - v 10ti letech délka 3m; listy žluté
- 'Gloire de Boskoop' - celoročně červenohnědé listy
- 'Green Showers' - listy větší a tmavší
- 'Green Spring'/'Printemps Vert'/*Ampelopsis veitchii* - výška 10m; větve v mládí načervenalé; listy jednoduché, dlouhé do 25cm, hladké, zelené, lesklé, na spodní straně matné, jemně síťnaté, v mládí načervenalé
- 'Lowii'/var. *lowii*/*Ampelopsis lowii* - výška 8m; listy dlouhé 2 - 3cm, jednoduché až 3četné, širší než delší, zastřižovaně pilovité, zelené, rašící červené, podzimní barva také červená
- 'Minutifolia' - výška 8m; listy o něco větší než 'Lowii', zelené, řapíky dlouhé 7 - 15cm, u starších exemplářů lesklé, na podzim růžovofialové a červené
- 'Purpurea'/var. *purpurea* - větve červené; listy červené, nezelenají, na podzim brzy zbarvené
- 'Robusta' - listy široce 3laločné, široké 10 - 20cm, dlouze řapíkaté, lesklé, na podzim červené a oranžové; rychlý růst
- 'Veitchii'/var. *veitchii*/P. *veitchii*/*Ampelopsis veitchii*/*Vitis veitchii* - výška 10m; mladé listy červené, menší, vejčité, max. 3četné, lístky na vnějším okraji s 1 - 3mi zuby, vnitřní strana celokrajná