

Bromelia (Bromélie)

čeleď: Bromeliaceae

Pochází z tropických pralesů střední a Jižní Ameriky. Většina z nich patří mezi epifyty. Vytváří centrální listové růžice s květem uprostřed, slouží jako zásobárna vody, vlastní listy jsou tuhé, dlouhé, mečovité, zašpičatělé, s hákovitými trny na okraji, zelené a na slunci bronzové. Květenství je mohutné, latovité, složené ze šištic s nápadnými zubatými listeny, vlastní květy jsou trubkovité a husté.

Potřebuje celoročně teplotu nad 18 - 20°C. Substrát by měl být propustný, nejlépe rašelinový doplněný o perlit, písek nebo nadrcenou kůru. Doporučuje se vyšší vzdušná vlhkost (ale není nutná) a dostatek světla (ne přímého slunce). Používáme měkkou, nejlépe dešťovou vodu. Přesazujeme zhruba po dvou letech a to po odkvětu. Hnojí se 1 - 2x měsíčně hnojiv pro orchideje.

Množí se odnožemi nebo semeny.

Bromelia agavifolia

Bromelia alsodes

Bromelia alta

Bromelia antiacantha

Bromelia arenaria

Bromelia arubaiensis

Bromelia auriculata

Bromelia balansae

oblasti: Jižní Amerika

Roste v Jižní Americe. Dorůstá výšky až 1,5m. Květenství je šišticovité, dlouhé až 1m, listeny jsou červené (nižší pouze na bázi), trnité a vlastní květy jsou fialové. Plodem je oranžovožlutá bobule. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. balansae
- f. tricolor

Bromelia binotii

Bromelia braunii

Bromelia chrysantha

Bromelia eitenorum

Bromelia epiphytica

Bromelia estevesii

Bromelia exigua

Bromelia flemingii

Bromelia fosteriana

Bromelia fragilis

Bromelia glaziovii

Bromelia goeldiana

Bromelia goyazensis

Bromelia grandiflora

Bromelia granvillei

Bromelia gurkeniana

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. funchiana

Bromelia hemisphaerica

Bromelia hieronymii

Bromelia horstii

Bromelia humilis (Bromélie nízká)

oblasti: Venezuela

Vytváří listové růžice žlutozelené barvy. Listy jsou tuhé, špičaté, ztlustlé a na okraji mají háčkovité trny. V době květu se střed růžice barví do červena. Kvete malými fialovými kvítky.

Bromelia ignaciana

Bromelia interior

Bromelia irwinii

Bromelia karatas

Bromelia laciniosa

Bromelia lagopus

Bromelia legrellae

Bromelia lindevaldae

Bromelia macedoi

Bromelia minima

Bromelia morreniana

Bromelia niduspuellae

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Bromelia oliveirae

Bromelia palmeri

Bromelia pinguin (Bromélie Pinguin)

oblasti: Jižní Amerika, Nikaragua, Portoriko

Pochází ze střední a Jižní Ameriky.

Bromelia plumieri

synonyma: Karatas plumieri

oblasti: Jižní Amerika, Portoriko

Pochází ze střední a Jižní Ameriky.

Bromelia poeppigii

Bromelia redoutei

Bromelia regnellii

Bromelia reversacantha

Bromelia rondoniana

Bromelia scarlatina

Bromelia serra

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. serra
- f. variegata

Bromelia superba

Bromelia sylvicola

[Bromelia tarapotina](#)

[Bromelia trianae](#)

[Bromelia tubulosa](#)

[Bromelia villosa](#)

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Brom%C3%A9lie>

http://www.bromelia.cz/p_40/bromelie.html

http://www.bydleniprokazdeho.cz/clanek.php?id_clanky=334

<http://www.dumabyt.cz/clanek/zahrada/pokojove-rostliny/pro-milovniky-tropu-bromelie/>

<http://www.floranazahrade.cz/200302/bromelie.htm>

<http://www.zivotnistyl.cz/clanky/zahrada/524/bromelie---skromne-pralesni-krasky.html>

<https://www.rostliny.net/>