

Cycas circinalis (Cykas svinutý)

synonyma: *C. f. gothanii*, *C. f. undulata*, *C. var. angustifolia*, *Cycas rumphii f. undulata*, *Cycas squamosa*, *Cycas squarrosa*, *Cycas tonkinensis*, *Cycas undulata*, *Cycas wallichii*, *Epicycas tonkinensis*, *Palma polyodiifolia*, *Zamia tonkinensis*

čeleď: Cycadaceae

oblasti: J Indie, Madagaskar, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Portoriko, Srí Lanka, Střední Asie, Thajsko, Tichý oceán, V Indie

Pochází z jihovýchodní Asie a východní Indie. Poprvé byl popsán v r. 1658. Oproti jednoznačně nejznámějšímu druhu *C. revoluta* má namodralejší, méně tuhé a pichlavé listy. Kmen vytváří výmladky, je nízký, přibližně platí 1cm = 1 rok. Dosahuje výšky max. 4 (i 7)m při průměru kmene 25 - 40cm. Nové listy narůstají po 1 - 2 letech po 15 - 20ks, jsou zpeřené, tvořené (50 -) 90 - 120 párů lístků, dlouhé 1,8 - 3m, vlastní lístky úzce kopinaté, mírně zahnuté, zelené nebo namodralé, v mládí hnědě ochlupené, střední lístky dlouhé 20 - 30cm, široké 0,9 - 1,3cm, okraj mírně podvinutý, řapíky jsou dlouhé 50 - 70cm, na spodní straně jsou 1/2oblé, na horní 3hranné, ostře trnité s 2 - 3mm trny (někdy 1/2 bez trnů). Protože se jedná o rostlinu dvoudomou, existují samčí a samičí rostliny. Samičí sporofyly jsou dlouhé 15 - 30cm, jsou hustě hnědě plstnaté, obsahují 6 - 12 vajíček, samičí šištice samostatné, válcovitě vejčité, dlouhé 60 - 70cm, široké 15 - 18cm, žlutohnědě plstnaté, sporofyly dlouhé 3,5 - 5cm. Červenožlutá semena a mladé listy se používají jako potrava. Dřeň kmene nahrazuje ságo. Důležité je ale dodržet postup přípravy, protože všechny cykasovité rostliny obsahují nervové jedy.

Potřebuje dostatek vody. Pro zabránění spálení listů jej neumistujte na přímé světlo.

<https://www.rostliny.net/>