

Ipomoea hederifolia

synonyma: *Convolvulus acutangulus*, *Convolvulus angulatus*, *Convolvulus coccineus* var. *hederifolius*, *Convolvulus hederifolius*, *Convolvulus luteolus*, *Convolvulus phoeniceus*, *Convolvulus sanguineus*, *Doxema sanguinea*, *Ipomoea angularis*, *Ipomoea angulata*, *Ipomoea brevipedicellata*, *Ipomoea coccinea*, *Ipomoea coccinea* var. *curviflora*, *Ipomoea coccinea* var. *hederifolia*, *Ipomoea coccinea* var. *luteola*, *Ipomoea hephrophylla*, *Ipomoea luteola*, *Ipomoea nephrophylla*, *Ipomoea phoenicea*, *Ipomoea sanguinea*, *Mina hederifolia*, *Quamoclit acutangula*, *Quamoclit angulata*, *Quamoclit brevipedicellata*, *Quamoclit coccinea* var. *hederifolia*, *Quamoclit coccinea* var. *luteola*, *Quamoclit dichotoma*, *Quamoclit hederifolia*, *Quamoclit luteola*, *Quamoclit phoenicea*, *Quamoclit sanguinea*

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Nové Mexiko, Pákistán, Portoriko, Texas, Vermont, Virginie

Roste v Americe jako popínava jednoletka, ale rozšířila se do jiných tropických oblastí. Povrch je řídce ochlupený. Listy jsou 5 - 7 milaločné, obrysem vejčité až kulaté, špičaté až zašpičatělé, zubaté a dlouhé 2 - 15cm. Kvete v po 1 až několika ks v okolíku, vlastní květy mají kališní lístky podlouhlé až eliptické, zašpičatělé až uťaté, dlouhé 1,5 - 3mm, koruna je červená až žlutočervená a dlouhá 2,5 - 4,5cm. Plody jsou tobolkovité, kulovité, dlouhé 6 - 8mm a obsahují hruškovitá tmavěhnědá až černá semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Sunspods' - oranžové květy

<https://www.rostliny.net/>