

Ipomoea nil

synonyma: Batatas setosa, Calonyction campanulatum, Calonyction pavonii, Calonyction setosum, Convolvulus hederaceus, Convolvulus nil, Convolvulus setosus, Convolvulus tomentosus, Gomphipus setosus, Ipomoea cuspidata, Ipomoea desertorum, Ipomoea githaginea, Ipomoea hederacea, Ipomoea hederacea var. integriuscula, Ipomoea longicuspis, Ipomoea melanotricha, I. var. setosa, Ipomoea pavonii, Ipomoea scabra, Ipomoea setosa, Ipomoea setosa var. campanulata, Ipomoea setosa var. pavonii, Ipomoea trichocalyx, Ipomoea vaniotiana, Pharbitis cuspidata, Pharbitis githaginea, Pharbitis hederacea, Pharbitis nil, Pharbitis purpurea

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Kalifornie, Louisiana, Maryland, Mississippi, Oklahoma, Pákistán, Portoriko, Texas

Roste v Americe jako jednoletka a popínavka, ale rozšířila se po celém světě. Dorůstá výšky 3,5m. Povrch je ochlupený. Listy jsou 3 (i 5)tilaločné, obrysem vejčité až kulaté, špičaté až zašpičatělé, ochlupené, dlouhé (3 -) 5 - 8 (i 15)cm a báze je srdčitá. Květenstvím je 1 - 6tičetný okolík, vlastní květy mají kališní lístky úzce kopinaté, dlouhé 1,5 - 2,5cm, koruna je modrofialová nebo růžová s bílým hrdlem, průměru několika cm a délky 3 - 5cm. Plodem je kulovitá tobolka délky 0,8 - 1,2cm a obsahuje hruškovitá ochlupená semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Early Call'
- 'Rose Silk'
- 'Scarlet O'Hara' - květy tmavě červené

<https://www.rostliny.net/>