

Maranta arundinacea (Maranta třtinová)

synonyma: *M. f. sylvestris*, *M. var. indica*, *M. var. variegata*, *Maranta indica*, *Maranta ramosissima*, *Maranta silvatica*, *Maranta sylvatica*, *Maranta tessellata* var. *kegeljani*, *Phrynium variegatum*

čeleď: Marantaceae

oblasti: Florida, Guyana, Portoriko, Z Brazílie

Pochází z tropické Ameriky. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří článkovitý oddenek délky 25 - 45cm, šířky 1,5 - 2cm, který je po převaření jedlý. Lodyhy dorůstají výšky 1 - 3m. Střídavé vejčité listy jsou charakteristické zduřením mezi řapíkem a čepelí, dále jsou 2řadé, spodní dlouze stopkaté a horní mají dlouhé objímavé pochvy. Květenství je klasovité, vlastní květy jsou bílé, symetrické a koruna je trubkovitá se 3mi cípy. Plodem je eliptická pukající 3chlopnová tobolka obsahující po 1 semeni. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegata' - béžově panašované listy

Vyhovují ji hluboké vlhké půdy. Nesnáší mráz.

<https://www.rostliny.net/>