

Amelanchier sanguinea (Muchovník krvavý)

synonyma: Amelanchier amabilis, Amelanchier canadensis var. rotundifolia, Amelanchier canadensis var. spicata, Amelanchier huronensis, Amelanchier rotundifolia, Amelanchier spicata, Aronia sanguinea, Crataegus rotundifolia, Mespilus amelanchier, Mespilus canadensis var. rotundifolia, Pyrus sanguinea

čeleď: Rosaceae

oblasti: Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky kde roste v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve jsou v mládí červené až šedé. Listy jsou široce eliptické, pilovité, špičaté nebo tupé, dlouhé 2,5 - 7cm, spodní strana je v mládí plstnatá, báze je srdčitá a žilnatinu tvoří 11 - 13 párů žilek. Květenstvím je převislý 4 - 10tičetný hrozen o délce 4 - 8cm, korunní lístky jsou bílé (i narůžovělé), dlouhé 1 - 1,4cm a stopky jsou dlouhé do 1cm. Plodem je temná růžovofialová ojíňená jedlá malvice. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Northline'

Vyhovují mu chudé suché půdy.

Rozrůstá se stolony.

<https://www.rostliny.net/>