

Amelanchier spicata (Muchovník klasnatý)

synonyma: Amelanchier humilis, Amelanchier humilis var. campestris, Amelanchier humilis var. compacta, Amelanchier humilis var. exserrata, Amelanchier mucronata, Amelanchier stolonifera, Amelanchier spicata, Crataegus spicata, Pyrus ovalis

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alabama, Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě v podobě opadavého keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 4 (i 5)m. Větve jsou zprvu sivozelené, později hnědočervené s čárkovitými lenticelami. Listy jsou eliptické až vejčité, špičaté, v horních 2/3 pilovité, v mládí plstnaté, modrozelené, dlouhé 2 - 6cm, báze zakulacená a žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek. Květenstvím je vzprímený 4 - 10tičetný vzprímený hrozen s délkou 1,5 - 4cm, vlastní květy jsou bílé nebo narůžovělé a korunní lístky jsou dlouhé 0,4 - 1,2cm. Plodem je jedlá temně růžovofialová ojíněná malvice průměru 6 - 8mm se stopkou o délce 1 - 3cm.

Vyskytuje se na plném slunci na skalnatých svazích (zpravidla vápencových), štěrk, dunách a suchých borových lesích. Půda může být písčitá i jílovitá, mírně kyselá až zásaditá.

Množí se semeny, hřížením a odkopky.

<https://www.rostliny.net/>