

Pinguicula vulgaris (Tučnice obecná)

čeleď: Lentibulariaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Česká republika, Grónsko, Irsko, Itálie, Katalánsko, Labrador, Maine, Manitoba, Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Vermont, Wisconsin, Yukon

Roste v severních oblastech. Patří mezi trvalky. Na zemi vytváří přizemní růžici ze které vyrůstá stonek o výšce 5 - 18 (i 25)cm nesoucí modrofialový květ dlouhý 1 - 1,3cm. Listy jsou žláznaté a ochlupené a přizpůsobené tak k chytání hmyzu. Jejich tvar je eliptický a okraje jsou nadvinuté. Kvete na 5 - 25cm dlouhém stvolu. Plodem je tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *anzalonei* - endemit Itálie
- subsp. *bohemika* (Tučnice obecná česká) - českolipsko; koruna bělavá až světlefialová v ústí s tmavěfialovou skvrnou, ostruha má 1/2 délku koruny a je tupě špičatá, horní kališní cípy jsou zakulacené; tobolky jsou široce hruškovitě vejčité; chráněný druh C1
- f. *bicolor* - vyhovují jí zásadité půdy
- subsp. *ernica* - endemit Itálie
- subsp. *vestina* - endemit Itálie
- subsp. *vulgaris* (Tučnice obecná pravá) - koruna modrofialová v ústí s bělavou skvrnou, ostruha má délku 1/3 - 1/4 délky koruny a je špičatá, horní kališní cípy jsou tupě špičaté; tobolky jsou dlouze vejčité; chráněný druh C2

Vyhovují jí slatiny, rašeliniště, vlhké štěrby nebo jiná mokrá místa s kyselou nebo i zásaditou půdní reakcí.

<https://www.rostliny.net/>