

Vaccinium myrtoides

synonyma: *Agapetes myrtoides*, *Thibaudia myrtoides*, *Vaccinium microphyllum*, *V. var. celebicum*, *Vaccinium varingiaefolium*, *Vaccinium villarii*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Filipíny, Melanésie, Sulawesi (Celebes)

Roste na Filipínách a Moluckých ostrovech v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,3 - 2m. Větve jsou v mládí krátce ochlupené. Listy jsou husté, téměř střežovité, vejčité až eliptické, přišpičaté, kožovité, celokrajné, dlouhé 1,3 - 2,5cm, široké 0,6 - 1,8cm, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, báze kulatá až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé do 1,5mm. Květenstvím je úžlabní řídký 4 - 12tičetný hrozen s vřetenem délky 1 - 4cm, vlastní květy mají stopku délky 0,5 - 1,4cm, koruna je dlouze baňkovitá, červená až bílá či béžová, dlouhá 4 - 5mm a široká 2,5mm. Plodem je kulovitá černomodrá bobule průměru 4 - 5mm.

<https://www.rostliny.net/>