

Melaleuca styphelioides

synonyma: *Leptospermum styphelioides*, *Melaleuca obliqua*, *Myrtoleucodendron styphelioides*

čeleď: Myrtaceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 5 - 25m. Borka je ve vrstvách, papírová nebo tvrdá a šupinatá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, přisedlé, zpravidla zkroucené nebo žlábkovité, vejčité, špičaté, zprvu drobně ochlupené, dlouhé 0,4 - 2,5cm, široké 2 - 6mm a s 15 - 30ti žilkami. Květenstvím je hustý úžlabní až téměř vrcholový klas délky 3 - 5cm, květy v triádách, listeny opadavé, listence vejčité, šídlovité, ochlupené, opadavé, dlouhé do 3mm, kalich má trubku vejčitou (i baňkovitou), může být ochlupený, žebernatý, dlouhý 1,5 - 2,5mm, laloky jsou 3úhlé, zašpičatělé, žilkované, ochlupené, dlouhé 1,5 - 2mm, korunní lístky jsou bílé až světle béžové, prakticky kulaté, dlouhé 1 - 2mm a krátce nehetnaté. Plodem je pohárkovitá až vejčitá tobolka délky 2 - 3,5mm, šířky 2 - 3mm v klasech. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *squamophiloia* - Queensland; možná hybrid *M. styphelioides* x *M. bracteata*; kališní laloky menší a bohatší než u *M. bracteata*, ale nehetnaté korunní lístky a početnější žilky listech jsou blíže k *M. styphelioides*
- var. *styphelioides*

<https://www.rostliny.net/>