

Pyracantha coccinea (Hlohyně šarlatová)

synonyma: Cotoneaster pyracantha, Crataegus hyracantha, Crataegus pauciflora, Crataegus pyracantha, Gymnopyrenium pyracantha, Mespilus lalandi, Mespilus pauciflora, Mespilus pyracantha, P. var. pauciflora, Pyracantha lucida, Pyracantha pauciflora, Pyracantha pyracantha, Pyracantha spinosa, Pyracantha vulgaris, Timbalia pyracantha

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arkansas, Balkánský poloostrov, Britská Kolumbie, Česká republika, Florida, Georgia, Írán, Itálie, Jižní Karolína, JV Evropa, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Krym, Louisiana, Malá Asie (Anatolie), Mississippi, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Ukrajina, Utah, Virginie

Roste v Itálii, Balkánu, Malé Asii, Krymu a Kavkaze v podobě rozkladitého stálezeleného keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 3m (i 5m zejména u zdi). Větve jsou červenohnědé, v mládí řídce plstnaté a kolce jsou dlouhé (0,5 -) 1 - 1,5 (i 2,5)cm. Listy jsou dlouze kopinaté až úzce eliptické, tupé až špičaté nebo zakulacené, vroubkovaně pilovité, v mládí ochlupené, tmavě zelené, lesklé, kožovité, dlouhé 2 - 4 (i 5)cm, široké 0,8 - 1,3 (i 1,5)cm, spodní strana je světlejší, řapíky dlouhé 5 - 8mm a vydrží na keři více než 1 rok. Kvete bělavými (i narůžovělými či nažloutlými) 5tičetnými květy v chocholících o průměru 3 - 4cm, vlastní květy mají průměr 5 - 8mm, kališní cípy jsou 3úhlé, ochlupené, korunní lístky jsou kulaté a dlouhé (2 -) 2,5 - 4mm. Plodem je červená malvice (u samičí rostliny) o velikosti 5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Anatolia' - rozkladitý habitus; výška 1 - 2m, šířka 1 - 1,5m; spodní větve kaskádovité; listy tmavě zelené; plody červené až oranžové
- 'Bad Zwischenahn' - široce vzpřímený habitus; výška 2 - 3m; větve výrazně trnité; listy široce eliptické až obvejčité, lesklé, tmavě zelené, vroubkovaně pilovité; plody červené, bohaté, dlouhé 8mm a široké 9mm
- 'Baker's Red' - plody červené
- 'Compacta' - kompaktní hustý habitus; výška 1,5m; listy menší
- 'Ebben'/'Lalandei Major' - kulovitý až široce kuželovitý habitus; listy široce eliptické až obvejčité, vroubkované; plody světle oranžové nebo červené, dlouhé 7mm a široké 8,5mm
- 'Fiery Cascade' - výška 3m; listy malé a lesklé; plody oranžové až červené
- 'Gnozam'/'Gnome' - hustý habitus; výška i šířka 1,8m
- 'Kasan' - konce mladých větví ochlupené; listy široce eliptické, špičaté, na vrcholu tupě pilovité; plody bohaté, žlutě oranžové, dlouhé do 9mm a široké 1,1cm
- 'Lalandei' - široký zploštělý habitus; větve v mládí ochlupené; listy úzce vejčité, špičaté, zelené, vroubkovaně pilovité, dlouhé 2 - 4cm; plody bohaté, tmavě červeně oranžové, dlouhé 1cm a široké 8mm
- 'Lowboy' - rozkladitý habitus; výška 1m a šířka až 2,4m
- 'Orange Glow' - plody oranžové
- 'Pauciflora' - kompaktní kulovitý habitus; listy drobné a lesklé; plody červeně oranžové
- 'Red Column' - plody červené
- 'Red Cushion' - plody červené
- 'Rutgers' - výška do 1m
- 'Soleil D'or' - plody žluté
- 'Telstar' - kuželovitý řídký habitus; listy široce eliptické, špičaté, vroubkované až tupě pilovité, tmavě zelené; plody oranžové, délky 8mm a šířky 1,1cm
- 'Teton' - kompaktní habitus; v 10ti letech výška 1m; drobné lístky
- 'Walker's Pride' - kompaktní habitus; záhy plodící, plody oranžové
- 'Yukon Belle' - výška i šířka 1,8 - 2,4m; plody oranžové; odolný

Je mrazuvzdorná. Vyhovuje ji plné slunce, neutrální až mírně vápnitá hlinitá dobře propustná půda bohatá na živiny. Zalévat stačí pouze v období sucha. Využívá se na živé ploty, kdy se vysazuje ve vzdálenosti 1m od sebe.

Množí se semeny, které musí projít stratifikací anebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>