

Kalopanax septemlobus (Kalopanax pestrý)

synonyma: Acanthopanax septemlobus, Acer pictum, Acer septemlobum, Kalopanax pictus, Kalopanax pictus var. maximowiczii, Kalopanax ricinifolius var. chinense, Kalopanax ricinifolius var. maximowiczii

čeleď: Araliaceae

oblasti: Anhui, Connecticut, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hunan, Japonsko, J Korea, Jiangsu, Jiangxi, JV Sibiř, Maryland, S Japonsko, S Korea, Shandong, Shanghai, Střední Čína, Střední Japonsko, SV Čína, Tchaj-wan, V Sibiř, Zhejiang

Roste v východní Asii v podobě stromu. Dorůstá do výšky 12 - 15 (i 30)m. Na kmeni i větvích vyrůstají silné trny. Listy jsou výrazně 3úhle vykrajované, dlanitě rozdělené na 5 - 7 laloků, dlouhé 15 - 35cm. Kvete malými bílými květy ve vrcholové latě. Plodem je modře černá peckovice obsahující 2 semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Maximowiczii' - listy má hluboce laločnaté, 5 - 7 četně dlanité, spodní strana ochlupená

Počáteční růst je velmi rychlý, ale ve věku kolem 40 let se zpomaluje. Odolává i teplotám do -40°C.

<https://www.rostliny.net/>