

# Elaeagnus angustifolia (Hlošina úzkolistá)

synonyma: *E. subsp. orientalis*, *E. var. caspica*, *E. var. iliensis*, *E. var. orientalis*, *E. var. spinosa*, *Elaeagnus argentea*, *Elaeagnus caspica*, *Elaeagnus dactyliformis*, *Elaeagnus erivanensis*, *Elaeagnus hortensis*, *Elaeagnus hortensis subsp. continentalis*, *Elaeagnus hortensis subsp. littoralis*, *Elaeagnus hortensis subsp. moorcroftii*, *Elaeagnus hortensis subsp. songorica*, *Elaeagnus hortensis var. igda*, *Elaeagnus hortensis var. microcarpa*, *Elaeagnus hortensis var. orientalis*, *Elaeagnus hortensis var. songorica*, *Elaeagnus igda*, *Elaeagnus iliensis*, *Elaeagnus incana*, *Elaeagnus inermis*, *Elaeagnus litoralis*, *Elaeagnus longipes var. hortensis*, *Elaeagnus moorcroftii*, *Elaeagnus orientalis*, *Elaeagnus oxycarpa*, *Elaeagnus oxycarpa var. microcarpa*, *Elaeagnus songarica var. kozlovskajae*, *Elaeagnus songorica*, *Elaeagnus spinosa*, *Elaeagnus tifliensis*, *Elaeagnus tomentosa*, *Elaeagnus turcomanica*

čeleď: *Elaeagnaceae*

oblasti: Albánie, Alberta, Andalusie, Arizona, Arménie, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Connecticut, Česká republika, Čína, Francie, Idaho, Illinois, Iowa, Írán, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Kréta, Kypr, Maine, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, S Itálie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sýrie, Ťan-šan, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste od jižní Evropy po Čínu v podobě nižšího opadavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 10 (i 12)m a šířky 10m v rozložitém habitu. Borka je červeně hnědá, šupinatě rozpukaná. Povrch starších větví je lehce trnitý (trny mohou dosáhnout délky 3cm), v mládí světle šedivý, později přechází do hnědočervené. Listy jsou střídavé, úzce kopinaté, vrbovitě, tmavě zelené, našedlé, v mládí oboustranně ochlupené, dlouhé (2,5 -) 3 - 8 (i 10)cm, široké (0,4 -) 0,5 - 2 (i 4)cm, na spodní straně stříbřitě šupinaté a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květe oboupohlavnými nebo jednopohlavnými uvnitř žlutými vně stříbřítými zvonkovými aromatickými květy po 1 - 3ks o průměru (0,6 -) 0,8 - 1cm se 4mi korunními lístky v paždí listů, kalich je trubkovitý až zvonkovitý, dlouhý 1cm, cípy květního obalu kopinaté, vejčité nebo 3úhle kopinaté. Plodem je jedlá válcovitá až vejčitá žlutá až žlutě hnědá stříbřitě šupinatá peckovice, délky (0,7 -) 1 - 1,5 (i 2)cm se zakulacenými konci s podlouhlými, válcovitými nebo úzce vejčitými peckami. Plody se používají v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *angustifolia* - Čína, Rusko, Evropa; keř nebo strom; výška 3 - 7m; borka červeně hnědá, občas s trny délky 0,7 - 3m; větve v mládí stříbřitě bílé, šupinaté; listy kopinaté až čárkovité, eliptické nebo vejčité, dlouhé 2,5 - 7 (i 10)cm, široké 0,4 - 1,5 (i 4)cm; květy úžlabní po 1 - 3ks na 2mm stopce, aromatické, trubka dlouhá 5 - 6mm; plody šupinaté, dlouhé 0,7 - 1,4cm, široké 0,5 - 1cm, pecka podlouhlá, úzce vejčitá až úzce válcovitá

- f. *culta* - listy dlouhé 6,5 - 10cm, široké 2 - 4cm; květy s obalem zvonkovitým; plody dlouhé 1,7 - 2cm, široké 1,3cm, pecky úzce válcovité

- 'Emerald Magic' - vzpřímený habitus; listy tmavě stříbřité

- var. *orientalis*/var. *spinosa*/subsp. *continentalis*/var. *latifolia*/*E. inermis*/*E. orientali*/*E. sativa* - střeozemí, Kavkaz, Írán, střední Asie; mírně trnitý keř nebo strom; výška 3m; borka červeně hnědá, trny dlouhé 1,5 - 2cm; povrch v mládí stříbřitě šupinatý; listy úzce vejčité, eliptické nebo kopinaté, matně zelené, dlouhé 1,5 - 7cm, široké 0,7 - 3cm, spodní strana plstnatá; květy v paždí listů po 1 - 3ks na 2 - 3mm stopce, obal zvonkovitý, stříbřitě bílý, šupinatý, dlouhý (0,5 -) 0,7 - 0,8 (i 1)cm, trubka dlouhá 3 - 4mm, laloky 3úhle kopinaté, zašpičatělé; peckovice vejčité, dlouhé 2 - 3cm, pecky

podlouhlé

- 'Red King'/'King Red' - výška až 7m; plody tmavě červené, sladké, jedlé a průměru 2,5cm

- var. spinosa/E. spinosa - větve v mládí zpravidla trnité; listy eliptické, šupinaté, dlouhé 3 - 7cm;

plody menší a kulatější

- 'Velvet Touch'/'Cokes' - výška 6 - 7,5m; bez trnů; borka tmavě hnědá, odlupující se; listy stříbřitě šedé a dlouhé 5cm

- var. virescens - listy prakticky bez šupin, šedě zelené až zelené

Potřebuje dostatek přímého slunce a písčité půdy s dostatkem živin a vlhka, ale není to podmínkou. Dokáže odolávat mrazům do -45°C. Nevadí ji ani zasolená půda.

Množí se semeny, které se stratifikují při teplotách 6 - 10°C. Možné je také hřížení.

<https://www.rostliny.net/>