

Vaccinium myrtillus (Borůvka černá)

synonyma: *Myrtillus niger*, *V. subsp. oreophilum*, *V. var. oreophilum*, *Vaccinium oreophilum*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Alberta, Altaj, Anglie, Apeniny, Arizona, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Gruzie, Idaho, Irsko, Island, Japonsko, Jugoslávie, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Kolorado, Laponsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Montana, Německo, Nevada, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Oregon, Polsko, Portugalsko, Pyreneje, Rakousko, Rumunsko, S Mongolsko, Sajany, Skotsko, Slovensko, Střední Rusko, SV Evropa, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Utah, V Karpaty, Wales, Washington, Wyoming, Z Čína, Z Rusko

Roste v Evropě, severní Asii, Grónsku, západní Kanadě a na západě USA. Patří mezi opadavé nepravidelné řidší keře. Dorůstá výšky 20 - 40 (i 60)cm. Pod zemí vytváří dřevnatější kořenující výběžky. Stonek je přímý nebo vystoupavý, zelený, 3hranný a bohatě větvený. Listy jsou holé, okrouhle vejčité až vejčitékopinaté špičaté, drobně pilovité, dlouhé 1 - 3cm, široké 0,6 - 1,9cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Kvete samostatnými nebo párovitými bílými nebo narůžovělými převislými květy v paždí listů na 3 - 6mm stopkách, koruna má kulovitě baňkovitý tvar s krátkými nazpět ohnutými cípy, je bílá a načervenalá, dlouhá 3 - 6mm, cípy jsou krátké, zpětně ohnuté, kalich zelený a má 8 - 10 tyčinek. Plodem je modročerná (i bělavá, červená nebo nazelenalá) ojiněná kulovitá bobule o průměru 0,5 - 0,7 (i 1)cm, dužina je modrofialová. Využívá se v lidovém léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *alpinum* - drobné okrouhlé listy
- '*Leucocarpum*'/f. *leucocarpa* - plody špinavě bílé
- var. *nanum* - nízké keříky; listy drobné, kulaté
- subsp. *oreophilum*/*V. oreophilum* - západ USA a jihozápadní Kanada
- var. *turfosum* - ekotyp

Vyhovují ji smíšené nebo jehličnaté lesy, rašeliniště, atp. s kyselou půdou, najde se i na pasekách, chudých skalách, okrajích rašelinišť, atp. Pro růst vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost a mykorhizu, kvůli které se ve běžné zahradě s velkou pravděpodobností neujme.

<https://www.rostliny.net/>