

Vaccinium crenatum

synonyma: *Adnaria crenata*, *Gaylussacia crenata*, *Metagonia prostrata*, *Vaccinium attenuatum*, *Vaccinium escallonioides*, *Vaccinium ottonis*, *Vaccinium reclinatum*, *Vaccinium reflexum*, *Vaccinium retifolium*, *Vaccinium secundum*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Ekvádor, Peru, Venezuela

Roste ve Venezuele, Ekvádoru a Peru v podobě rozložitého až plazivého (i vzpřímeného) keře a kmínky dokáží znovu zakořenit. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou krátce ochlupené. Listy jsou mírně kopinaté, kožovité, oboustranně špičaté, asymetricky vroubkované, v mládí načervenalé, dlouhé 0,6 - 1,9cm, široké 0,2 - 1cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, načervenalé, 1 - 3četné, vřeteno má délku 0,2 - 1,1cm, listeny vytrvávající, dlouhé 1 - 1,5mm, květy mají stopky délky 4mm, listence jsou dlouhé do 1,5mm, kalich je holý, dlouhý 3 - 4mm, koruna je úzce baňkovitá, červená, holá a dlouhá 5 - 8mm. Plodem je kulovitá modročerná lesklá a holá bobule průměru 9mm.

<https://www.rostliny.net/>